

	PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL				
	FICHA TECNICA				
	R-GCO-035	Versión: 01	Fecha: 05-sep-17		Página 1 de 1

NOMBRE COMERCIAL	Carpinelo ®	TIPO DE PRODUCTO	Medicamento		
NOMBRE GENERICO	Pilocarpina Clorhidrato 5,0 mg	TIPO DE RIESGO	No aplica		
CONCENTRACION	5,0 mg				
FORMA FARMACEUTICA	TN - Tabletas con o sin recubrir, que no modifiquen liberación del farmaco.				
DESCRIPCION	Agente parasimpaticomimetico, aumenta la secreción de las glándulas exocrinas, tales como las glándulas sudoríparas, salivales, lagrimales, gástricas y parotidas.				
COMPOSICION	Cada tableta contiene pilocarpina clorhidrato 5,0 mg				
INDICACIONES	Para el tratamiento de los síntomas de la boca seca por hipofunción de las glándulas salivales causado por radioterapia por el cancer de cabeza y/o cuello y tratamiento de los síntomas de la boca y ojos secos en pacientes con "sjogren".				
CONTRAINDICACIONES	Hipersensibilidad conocida a la pilocarpina o cualquiera de los excipientes, enfermedad cardiorenal significativa y no controlada y otras enfermedades crónicas que empeoren con antagonistas colinérgicos tal como iritis aguda.				
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS	Puede producir sudoración, náuseas, secreción nasal, diarrea, escalofríos, aumento de la frecuencia de orinar, mareo, cefaleas, vómito, acidez estomacal, inflamación de brazos, manos, pies, tobillos o pantorrillas, dolor ocular, lagrimeo, conjuntivitis, hipertensión, vasodilatación.				
VIDA UTIL	24 MESES	REGISTRO INVIMA	2015M-0016633	CODIGO ATC	S01EB01
TITULAR	SerAnest Pharma Ltda.	FABRICANTE	Colompack S.A.		
PRESENTACION COMERCIAL	Frasco pastillero color blanco opaco con tapa en polipropileno por 20, 30, 60, 90 y 100 tabletas				
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura inferior a 30° C en su envase y empaque original.				
DOSIS Y ADMINISTRACION	La presentación de la pilocarpina son tabletas para administrarse por vía oral. para los pacientes que sufren de sequedad en la boca ocasionada por la radioterapia en cáncer de cabeza y cuello, la dosis recomendada es tomar tres veces al día. En pacientes que sufren de sequedad en la boca ocasionada por el síndrome de Sjogren, generalmente se toma cuatro veces al día. La administración de Carpinelo debe ser tomada más o menos a la(s) misma(s) hora(s) todos los días.				
SOBREDOSIS	Actualmente hay información limitada sobre la sobredosis de pilocarpina por consumo accidental, pero en caso de tener sobredosis los síntomas presentados podrían ser dolor de cabeza, espasmos gastrointestinales, espasmos, dificultad para respirar, temblor incontrolable de una parte del cuerpo, confusión.				
Revisó y Aprobó:	HUMBERTO LEON TORRES		Fecha de aprobación	5/09/2017	
	Director Técnico				

